n.° 26. Par m. Castanet m.e en chir. à pamiers.

Un Pretre agé d'Environ quarantetrois ans fit une Cheute de cheval vers la mi Novembre de l'année derniere. l'endroit ou Il tomba etoit plenier, sans pierres, mais la terre fort dure. le Cheval n'alloit point bien vite: Il etoit d'ailleurs tres petit, et le cavalier touchoit presqu'a terre avec les pieds. Cependant comme tout son corps porta sur le coté droit parce qu'il se laissoit aller sentant qu'il etoit prêt à tomber il en eut l'épaule meurtrie, le bras entamé, la rotule demise et une Contusion à la hanche qui lui causoit des Douleurs extremement vives. Ce qu'il sentoit à l'épaule n'eut point de suite. on lui remit la Rotule; et la douleur a la hanche ou l'on n'apercut jamais de noirceur, mais seulement une rougeur et une enflure presqu'imperceptible, étant attribuées a une foulure des nerfs On se Contenta d'y metre d'abort un cataplasme fait avec du savon, de l'huile un peu de eau de vie, et puis de l'huile de lin. Il feut pres de trois semaines sans pouvoir se trainer: Il lui etoit meme bien dificile de se metre sur son seant dans son lit. quand il put marcher à l'aide de deux Batons, Il ne pouvoit guere se plier sur une Chaise, Il acquit pourtant avec le tems un peu plus de souplesse mais comme Il Boitoit toujours et qu'il ne marchoit qu'avec beaucoup de peine, meme avec le secours d'une Cane, un Chirurgien qui le visita trois mois apres la cheute, lui fit remarquer qu'il avoit le Coté droit plus court d'un demi pouce, et qu'il setoit le pied et le genou en Dehors. Tel est encore son etat, Il eprouve les memes douleurs aux nerfs de la Cuisse, particulierement a l'endroit ou Il eut La Contusion, et un engourdissement assez Considerable à deux ou trois travers de doit au dessus du Genou. Pour s'asseoir Il faut qu'il porte le pied droit devant le pied gauche. Assis Il ne peut plier la Cuisse, quoi qu'il la prenne avec les mains, ny rapprocher le Genou droit du genou gauche. D'ailleurs Il a assés de force a la partie malade pour y appuyer tout son Corps durant quelques moments et Il peut faire les Cinq mouvements de la Cuisse, avec autant de facilite que s'il n'avoit point de mal. Pour de tumeur Il n'y en a point. on ne Connoit meme aucun deplacement d'os, Il paroit seulement que du Coté droit les

ARC 31 d 4 n° 79

le Femur est tant Soi peu plus gros et le trochanter un peu plus — saillant que du Coté gauche

Voila Monsieur Le Rapport exact que le Blessé me fit le — 25 avril. dernier, qui feut ma premiere visite, la cheute luy estant — arrivée a vingt Lieües de notre ville et n'arriva a Sanvers que vers la mij avril dernier. Vous Connoissez mieux que moy Monsieur Le mechanisme et la Structure de l'articulation de la tête du femur dans la Cavité — Cotiloïde des os des hanches et Les moyens que l'auteur de la nature a pris pour afermir cette jonction, pour la metre a Couvert des Ecarts et des Cheutes ou l'homme est exposé pendant le cours de La vie. Mais — a des forces Superieures rien ne peut resister. Il né me paroit pas — possible que la Cheute que fit cét homme, et dans le sens qu'il la fit, feut capable de luxer l'os de la Cuisse, Si bien afermi dans Sa cavité; Je parcourus tous Les endroits ou la tete du femur peut Se jetter, — dans Les differantes Luxations qu'il peut éprouvér, mais Inutillement Je la Cherchai, Je ne peus la decouvrir dans aucun lieu etranger: — ce n'est pas assurement Le volume des muscles de Cette partie qui — peut m'en derrober la Connoissance; car lé Blessé est assés maigre mais au Contraire, Je reconnus parfaitement, que la tête du femur — etoit reellement dans Sa cavité naturelle, et ce qui lé prouve, c'est que lé Blessé, fait tous lés cinq mouvements de cette partie, aussi — aisement que de la partie Saine, et Sur tout Le mouvement de — Circonduction, avec une grande facilité, et Sans la moindre Douleur — Il n'est pas possible, qu'un os deplacé, puisse faire les memes — mouvements qu'il les faisoit auparavant de l'être: mais lorsque — le Blessé veut faire la flexion du Genou, avec force, Il est obligé

deprendre Le tibia avec Ses deux mains, vers Sa tuberosité; alors Il trouve une espece de Corde Douleureuse qui regne depuis Lós pubis et Sétend Jusques vers lapartie moyene, et Interne, dela Cuisse. Jexaminai, cette corde, et jé reconnus qué cêtoit Le tendon du Muscle triceps Superieur. vous le Saves Monsieur, que ce muscle a Ses ataches Superieures, par un fort tendon, vers La Simphise des os pubis, et va Se terminer obliquement, vers la partie moyene et posterieure dela cuisse. au Surplus le Blessé descend Lescalier avec la meme vitesse qu'avant Son accident, maix Il a un peuplus depeine ale monter: D'ailleurs Il promene dans les rües comme avant Sa Cheute, pourtant álaide d'une canne et en Boitant. Il Sagit maintenant, Los nestant pas Luxé, de rendre la Raison pourquoi la Jambe du Blessé est plus Courte denviron un Demy pouce que la Jambe Saine. Voila cequi est audessus de mes lumieres Jay donc Besoin dela Celebrité des votres: J'ose mé Flater Monsieur que vous voudres bien m'honnorer de vos Conseils, dans cette Circonstance. Le Blessé Les atend egalement que moy, avec la derniere Impatience; J'auray l'honneur de vous observer que le Blessé, pour qui Je m'interesse, est un homme de lumieres, et q'uil à fait toutes Les recherches pour decouvrir Si l'os, etoit Luxé, et qui ne la Jamais trouvé en nullepart, mais au Contraire q'uil a reconnû q'uil etoit dans Sa place naturelle; egalement que moy; car enfin latête du femur, est d'une figure et d'un volume asser Considerable, pour estre decouvertes, et Sur tout Sur un Sujet maigre, tel quest lé Blessé pour qui Je parle.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE